

Plateau du Parmelan



Pin à crochets

Pinus uncinata

Arbres pouvant atteindre 25m de haut, d'une très grande longévité.

Très résistant à la sécheresse au vent et au froid, on le rencontre de 1500m à 2800m là où les autres essences d'altitudes sont absentes ou peu concurrentielles



ALISIER NAIN

Sorbus chamaemespilus

(*Sorbus* signifiait « arbre aux fruits rouges »)

Arbrisseau de 1 à 3 m .

On le trouve de 800m à 2400m,
mais principalement à l'étage
subalpin.

Plante mellifère

Les fruits sont comestibles



Bois joli

Bois gentil

Daphne mezereum

- Thyméléacées -

Floraison de février à mars avant la feuillaison.

Pollinisée par les insectes.

Toutes les parties de la plante sont toxiques.

Espèce protégée en Limousin



Campanule en thyrses

Campanula Thyrsoïdes
Famille : Campanulacées

*Préfère les sols calcaires.
Fleurie de juillet à septembre,
entre 1500m et 2700m d'altitude*



CHENETTE - *Dryas octopetala* - (Rosacées)

Papillon : PETITE TORTUE - *Aglais urticae*



ATHAMANTE DE CRETE

Athamanta cretensis

Famille : Apiacées

Fleurie de juin à août, jusqu'à 2900m d'altitude



Gentiane de clusius

Gentiana clusii

-Gentianacées-

Généralement sur calcaire

Jusqu'à 2800m



Saule hasté

Salix hastata

Famille: *Salicacées*

Assez rare,

Etage montagnard à subalpin,
jusqu'à 2500m d'altitude



Pied de chat dioïque

Antennaria dioica
-Astéracées-

Plante dioïque :

*Pieds femelles, involucre à
bractées roses.*

*Pieds mâle, involucre à
bractées blanches ou rosées.*

Se rencontre jusqu'à 2800m.

*A protéger à basse altitude
où les populations se
raréfient*



Ail victorale

Ail de cerf

Herbe à neuf chemises

-*Allium victorialis*-

-Liliacées-

Assez rare, se rencontre de
600m à 2200m

Population assez importante
au Parmelan



Renoncule vénéneuse

Ranunculus thora

-Renonculacées-

Réputée comme étant la
plus toxique du genre



Raiponce orbiculaire

Phyteuma orbiculare

-Campanulacées-

Présente de l'étage
collinéen à l'étage Alpin

Jeunes pousses
consommées autrefois en
salade.

Espèce protégée en alsace
et Lorraine



Oreille d'ours

Primula auricula

-Primulacées-

Fleurie de mai à juillet jusqu'à
2900m.

Plante protégée sur tout le
territoire national.



Gentiane printanière

Gentiana verna

-Gentianacées-

Jusqu'à 3000m

Sol acide ou alcalin



Orchis globuleux

Traunsteineria globosa
-Orchidacées-

Fleurie de mai à août dans les
prairies et les bois jusqu'à
2600m d'altitude



Globularia cordifolia

Globularia cordifolia
-Plantaginacées-

Plante calcicole .

Se rencontre communément sur
roches, lapiaz et pelouses
sèches, de l'étage collinéen à
l'étage subalpin supérieur



Bartsie des Alpes

Bartsia alpina

-Orobanchacées-

(class.APG IV.2016)

Plante hémiparasite, capable de photosynthèse réduite.

Elle parasite de nombreuses plantes herbacées pour le reste des substances nécessaires à son développement

On la trouve dans les pâturages, prairies humides et pentes bien drainées, jusqu'à 2700m



Erine des Alpes

ERINUS ALPINUS

- Plantaginacéaé -



Orchis vanille

Nigritelle noire

Nigritella rhellicani

Fleur parfumée - odeur de vanille

Prairies jusqu'à 2800m

